

Uterusrelaksasjon, akutt.

Endring siden forrige versjon

Ingen endringer

Hensikt

Sikre at pasienten får optimal behandling ved behov for rask relaksasjon av uterus.

Målgruppe

Leger og jordmødre ved føde-barselseksjonene.

Fremgangsmåte

Indikasjoner

1. Undertrykke uterine kontraksjoner for å bedre uteroplacentær sirkulasjon.
Kan være aktuelt ved:
 - Truende asfyksi mens man forbereder forløsning ved keisersnitt.
 - Ikke-oxytocinbetiget hyperaktivt riarbeid.
2. Relaksere kontrahert cervix.
 - Ved manuell placentaløsning/placentauthenting.
 - Hvis cervix gendannes før aktiv forløsning av tvilling II.
 - Ved seteforløsning med fastsittende hode pga cervixspasme.
3. Relaksere uterus ved:
 - Navlesnorsfremfall mens man gjør klart til forløsning ved sectio.
 - Akutt og elektiv sectio ved prematuritet, for å sikre atraumatisk forløsning.
 - Truende uterusruptur mens man forbereder forløsning ved sectio.

Aktuelle medikamenter i prioritert rekkefølge

- Atosiban (Tractocile®) 7,5 mg/ml, intravenøs bolusinjeksjon 0,9 ml (hetteglass 0,9 ml) = 6,75 mg, settes over minst 1 minutt.
- Nitroglycerin (Nitrolingual® munnspray 0,4 mg/dose, Nitroven® injeksjon 1 mg/ml).

Atosiban:

Intravenøs bolusinjeksjon med Tractocile® 0,9 ml (6,75 mg/0,9 ml) settes over 1 minutt.

Kontraindikasjoner

- Abruptio placenta.
- Placenta praevia.
- Stor vaginalblødning.

Bivirkninger hos mor

- Takykardi
- Hypotensjon
- Hodepine
- Ingen spesifikke bivirkninger er vist hos den nyfødte.

Nitroglycerin:

Munnspray Nitrolingual® 1-2 støt (0,4-0,8 mg) under tungen eller på munnslimhinnen uten samtidig innånding. Sprayen holdes vertikal med sprayhodet opp og så nær den åpne munnen som mulig. En enkel dose virker kun i 1-2 minutter. Det kan gis flere doser.

Kontraindikasjoner

- Ukorrigert hypovolemi, kalde ekstremiteter perifert. Sammenfalne vener. Stor blødning.
- Sjokk.
- Aortastenose.

Bivirkninger hos mor

- Hypotensjon.
- Hodepine.

Referanser

[Acute tocolysis for fetal distress: terbutaline versus magnesium sulphate, PubMed](#)
[Severe cardiotocographic pathology at labor: effect of acute intravenous tocolysis, PubMed](#)
[Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening](#)

Vedlegg**Andre kilder/litteraturliste**

1.

Slutt på Prosedyre