

Postoperativ sårdrenasje

Endring siden forrige versjon

Oppdatert valg av bandasje under punktet om seponering av dren

Hensikt

Sikre at håndtering av innlagt sårdrenasje i den postoperative fasen utføres korrekt

Målgruppe

Gjelder for sykepleiere og helsefagarbeidere ved ortopedisk avdeling SØ

Fremgangsmåte

Definisjon vakumdren:

Dren som ved hjelp av undertrykk bidrar til å fjerne blødning/sekret fra operasjonssåret (aktivt dren).

Drenet seponeres i løpet av 1 – 5 døgn avhengig av volumet på blødning/sekresjon.

I operasjonsbeskrivelsen spesifiserer operatør om drenet skal være aktivt/inaktivt og i hvor lang tid det ev. skal være aktivt. Drenet er som regel aktivt de 4 første timene postoperativt.

Bølgedren: passiv drenering av infiserte sår.



Aktivt dren:

Åpne slangeklemmen over belgen
Tømme belgen for væske og skap
vakuum ved aktivt dren.
Slangeklemmen under belgen
stenges

Passivt dren:

Slangeklemmen over og under belgen
åpnes slik at undertrykket fjernes

Ved ankomst til sengeposten:

- Merk deg totalt volum i posen ved ankomst til sengeområde. Sørg for at sårdrenet er dokumentert under *Utstyr/Prosedyre* i elektronisk kurve, dokumenter om det er passivt/aktivt.
- Observer eventuell blødning i bandasjen omkring dreninggangen – **Se, lukt og kjenn!**

Kontinuerlig overvåking og vedlikehold av vakuumdren inntil seponering:

- Tøm belgen ved hvert vaktskift og dokumenter i elektronisk kurve oppsamlet mengde siden siste tømning. Dokumenteres i fanen *Registrering*, trykk på knappen *Drenstap*. I kolonnen *Sårdren*, registrer du mengden væsketap.
- Der drenet blir liggende ut over 2 døgn postoperativt skal drengsposen skiftes hver morgen kl. 06:00
- Observer hud og bandasje
- Sørg for at slangene ikke får knekk
- Observere dreningssinnhold, dokumenter mengden som har kommet
- Sugeenheten skal festes under innstikkstedet for drenet
- Kontakt lege ved brått ingen drengasje eller uvanlig mye
- Drengsvæsken skal minke gradvis ikke plutselig
- Drengsmengden bør observeres to til fire timer postoperativt og deretter hver sjettede time
- Drenet fjernes etter ordinasjon fra lege

Tømme belgen for væske og skap vakuum ved **aktivt dren:**

- Slangeklemmen over belgen stenges
- Slangeklemmen under belgen åpnes
- Klem belgen sammen slik at blod/sårdrengasje overføres til oppsamlingsposen
- Hold belgen sammenklemt mens slangeklemmen under belgen stenges
- Slipp belgen
- Åpne slangeklemmen over belgen

Endre fra aktivt dren til passivt dren:

- Slangeklemmen over og under belgen åpnes slik at undertrykket fjernes

Tømme belgen for blod ved **passivt dren:**

- Slangeklemmen over belgen stenges
- Klem belgen sammen slik at blod/sårdrengasje overføres til oppsamlingsposen
- Slipp belgen
- Åpne slangeklemmen over belgen
- Merk av nytt nivå for drengasje på oppsamlingsposen

Seponering av dren:

- Utstyr:
 - ✓ Gul søppelpose
 - ✓ Munnbind
 - ✓ Suturkniv
 - ✓ Ren arteriepinsett
 - ✓ Sterile kompresser, 5 x 5 cm
 - ✓ Bandasjer, eventuell absorberende type ved rikelig blødning
 - ✓ Sterile hansker
 - ✓ Usterile hansker
- Sørg for rolig atmosfære for pasienten
- Informer pasienten om prosedyren og at selve fjerningen kan være ubehagelig
- Pasienten leies slik at drenet er lett tilgjengelig
- Håndvask før og etter prosedyre
- Klem av slangen over belgen med en klemme og arteriepinsett
- Fjern bandasje rundt drengåpningen
- Pakk ut sterilt utstyr

- Bruk sterile hansker
- Fjern eventuell sutur som fester dren til huden
- Trekk drenet ut ved å holde i drenslangen så nær åpningen som mulig. Varsomt og bestemt. Ikke rykk.
- Komprimer over åpningen med sterile kompresser, 5x5cm
- Fikser med Sorbact, eller Aquacel foam/absroberende bandasje dersom det er mye blødning
- Eventuelt blod i belgen klemmes over i oppsamlingsposen
- Noter mengden i posen og dokumenter i elektronisk kurve
- Avslutt/seponer utstyr/prosedyre i elektronisk kurve
- Drenasjesystemet håndteres som risikoavfall
- Observer eventuell blødning fra drensåpningen etter seponering av dren

Referanser[A.2.2.2/3.1-03](#)[Postoperativt - observasjoner, ortopedisk avdeling](#)**Slutt på Brukerveiledning**