

Pasientinformasjon for CT COLON Pakke 1 med tømning

Velkommen til røntgenundersøkelse av tykktarmen. For at vi skal kunne utføre undersøkelsen må tarmen være fullstendig tømt. I den forbindelse har vi lagt inn en e-resept på Sykehusapotekene. Henvend deg til enten

Sykehusapoteket i Moss (tlf: 69 86 44 99) eller **Kalnes** (tlf: 69 86 87 20).

Her får du kjøpt en pakke til bruk ved denne undersøkelsen. Pakken inneholder vanligvis 2 doser **CitraFleet**, 2 doser **Tagitol** og 1 flaske **Gastrografin**.

OBS! Det er KUN sykehusapotek som har disse preparatene, du kan ikke hente de på vanlige apotek.

På grunn av leveringsproblemer på Tagitol vil det i enkelte tilfeller kun utleveres Gastrografin og CitraFleet.

Disse medikamentene må du selv betale. Prisen er kr 950,- (prisen er veiledende, og varierer med prisjusteringer). Beløpet dekkes ikke av blå resept eller frikort.

Du kan få refundert dine apotekutgifter knyttet til undersøkelsen ved å fylle ut refusjonsskjemaet som ligger på Sykehuset Østfolds internettside under «Dine rettigheter».

Legg ved kvittering fra apoteket og send til adressen på skjemaet. Skjemaet kan du også få utlevert ved fram møte.

FREMGANGSMÅTE:

Dagen før undersøkelsen:

NB! Ingen fast føde, kun klar væske*.

Under forberedelsene til undersøkelsen bør du drikke minst 3 liter klar væske* i løpet av dagen. Dette er helt avgjørende for at preparatet skal gi optimal effekt. Væske drikkes også utenom de fastsatte klokkeslettene som er oppgitt nedenfor.

Klar væske* = vann, klar saft eller mineralvann, juice uten fruktkjøtt, klar suppe, svart te eller kaffe (unngå melk!).

1 glass = ca. 2 dl

Kl. 08.00		Drikk 2 glass klar væske, gjerne mer. Drikk deretter 1. dose TAGITOL blandet ut i et glass vann. Om du ikke har fått utlevert Tagitol: Drikk 2 glass klar væske.
------------------	---	--

Kl. 10.00		1. dose CitraFleet blandes i ett glass kaldt vann, rør rundt i 2-3 minutter før du drikker det. Drikk så umiddelbart minst 2 glass vann, helst mer. <i>(CitraFleet har sitronsmak, men inneholder IKKE sitrus, så du kan trygt ta dette preparatet dersom du har sitrus-allergi)</i>
Kl. 11.00 – 17.00		Drikk minst ett glass valgfri klar væske hver time, helst mer.
Kl. 17.00		Drikk 2. dose TAGITOL , blandet ut i et glass vann. Om du ikke har fått utlevert Tagitol: Drikk ett glass klar væske.
Kl. 19.00		2. dose CitraFleet blandes i ett glass kaldt vann, rør rundt i 2-3 minutter før du drikker det. Drikk så umiddelbart 2 glass vann, helst mer og gjerne fram til midnatt.
Kl. 22.00		Drikk ½ flaske Gastrografin (50 ml, kast resten).

Undersøkelsesdagen:

På undersøkelsesdagen skal det ikke inntas verken mat eller drikke, men du kan ta dine faste medisiner sammen med litt vann.

Utførelse av undersøkelsen:

Vi setter inn CO₂ gass gjennom et tynt kateter nederst i endetarmen. Ubehag i form av mageknip forekommer, men vil avta etter at undersøkelsen er avsluttet.

Selve undersøkelsen tar ca. 30 min, men regn med god tid for undersøkelsen, total tid ca. 90 min. (mtp parkering).

TA MED MATPAKKE

Når undersøkelsen er utført, kan du spise som vanlig før du forlater sykehuset.

Velkommen til oss på Sykehuset Østfold