

Galledren - håndtering

Endring siden forrige versjon

Klart

Hensikt

Sikre at pasienter som har galleblæredren behandles korrekt

Målgruppe

Sykepleiere og helsefagarbeidere som har ansvaret for gastrokirurgiske pasienter

Definisjon

Perkutan galleblæredrenasje brukes i enkelte tilfeller ved akutt cholecystitt, f.eks. når det foreligger cholecystitt/sepsis med påvist eller truende perforasjon eller når det påvises abscess

Galledrenet blir lagt inn av radiolog ved hjelp av ultralydveiledet punksjon av galleblæren. Drenet holdes på plass etter «pigtail» prinsippet, ved at låsetråden på kateteret strammes. Det finnes også galledren som blir lagt inn uten låsetråd.

Skifting av bandasje/pose

Bandasjen skal skiftes 1 gang pr uke. Ved sekresjon, lekkasje eller annet ubehag, skiftes den oftere. Det brukes ren prosedyre. Det er lettest å skifte når pasienten ligger i sengen.

Utstyr:

- Skiftesett
- NaCl 9mg/ml
- Drainfix bandasje
- Evt 5x5 cm kompresser

Gammel bandasje fjernes forsiktig, obs at kateteret ikke dras ut, det er ikke suturert fast. Huden rundt åpningen observeres for rødhet eller sårhet. Evt sekresjon observeres og dokumenteres i forhold til mengde, utseende og lukt. Erstatt med ny drainfix bandasje. Pass godt på dette, det er lett å få drag på kateteret slik at det sklir ut. Fest gjerne posen fast i tøyet med en sikkerhetsnål

Skylling av galledren ved grumsete/abscess innhold etter avtale med lege

- Ren prosedyre
- Begynn med å aspirere innhold, sett ned i posen.
- Sett inn 10-20 ml NaCl 9mg/ml, og aspirer forsiktig, sett ned i posen
- Observer mengde og innhold og dokumenter dette
- Dersom mengde skal måles, må skyllevæske trekkes fra på total mengde pr døgn og føres i elektronisk kurve

Fjerning av galledren

Galleblæredrenet blir som regel fjernet etter 14 dager med eller uten røntgenundersøkelse i forkant etter ordinasjon fra lege

Utsyr:

- Ren prosedyre
- Rene kompresser 5x5 cm, tørr bandasje

Pasienten ligger i sengen, gjerne på rygg. Fjern bandasjen, «hesteskoen» som fester tråden løsnes og tråden vikles ut. Dersom det er galledren uten låsetråd, er det bare å trekke kateteret ut. Åpningen dekkes med bandasje.

Kontrolltime avtales ved utskrivelse

Referanser

- Vedlegg

Slutt på Prosedyre