

## PICCLINE - fjerning av PICC-line kateter

---

### Endring siden forrige versjon

#### Hensikt

Sikre korrekt håndtering ved fjerning av PICC-line kateter.

#### Målgruppe

Alt helsepersonell som har ansvar for og kontakt med pasienter med innlagt PICC-line kateter i Sykehuset Østfold (SØ).

#### Fremgangsmåte

##### Generelt

- PICC-line kateter fjernes av sykepleier eller lege som kjenner prosedyren.
- Risiko for komplikasjoner ved fjerning av PICC-line er liten. Det anbefales allikevel at PICC-line fjernes på hverdager og dagtid (07:30-15:00) når anestesisykepleier med «PICC-line»-rolle (meldingsvarsler) er tilgjengelig dersom det skulle være spørsmål/problemer.

Det er vanligvis minimalt eller ingen blødning fra innstikksted etter fjerning av PICC-line. Pasienter med blødningstendens kan kreve noe lengre kompresjon og observasjonstid, og en bandasje med kompresjon kan være hensiktsmessig. Motstand ved fjerning av kateter er også svært sjelden.

##### Utøvelse

- La pasienten ligge med armen ut til siden
- Utfør håndhygiene
- Fjerne bandasje
- Legg to sterile kompresser over innstikkstedet og trekk kateteret langsomt ut
- Ved motstand stopper man å trekke. La pasienten legge armen i et annet leie og /eller legg på varmt omslag og vent cirka 30 min. Ved fortsatt motstand, dekk innstikkstedet med en steril bandasje og ta kontakt med anestesisykepleier «PICC-line» rolle
- Sjekk at kateterspiss er hel, konstater at hele kateteret er tatt ut
- Komprimer over innstikksted i minimum 5 minutter, lenger hvis fortsatt blødning
- Innstikkstedet dekkes med steril kompress og tett/transparent bandasje. La bandasjen ligge på til neste dag. Ved blødningstendens legges komprimerende bandasje
- Pasienten observeres 15 minutter etter fjerning av kateteret for blødning fra innstikkstedet.  
Unntak: Pasienter som bruker antikoagulantia eller har blødningstendens av andre årsaker, observeres i 1 time etter fjerning av kateter. Hvis fortsatt blødning, legg på komprimerende bandasje og hev eventuelt pasientens arm. Ta kontakt med pasientens lege eller anestesisykepleier «PICC-line» rolle.
- PICCline kateter fiksert med securAcath fjernes av sykepleier eller lege som er opplært i prosedyren

#### Referanser

##### [PICC-line - Vårdhåndboken](#)

##### Vedlegg

##### [V05](#)

##### [PICCLINE - innleggelse, bruksområde, observasjon og stell av kateter \(A3.5.2.2/3.1-30\)](#)

#### Slutt på Prosedyre