

Henvisning til anestesi ved ECT

Utfylles av henviser	☐ Frisk pasient utenom aktuelle, ingen faste legemidler			
	ALLERGI: ☐ Nei ☐ Ja: _____			
	Sykdommer:	Nei / Ja	Legemidler:	Nei / Ja
	Hjerte/kar-sykdom	☐ ☐	Hjerte/kar	☐ ☐
	Respirasjonss-sykdom	☐ ☐	Respirasjon	☐ ☐
	Smittsom sykdom	☐ ☐	Antikoagulantia	☐ ☐
	Nyre/lever/mage/tarm-sykdom	☐ ☐	Steroider	☐ ☐
	Stoffskifte-sykdom	☐ ☐	Andre hormoner	☐ ☐
	Skjelett/muskel-sykdom	☐ ☐	Mage/tarm	☐ ☐
	Annen sykdom		Antibiotika	☐ ☐
Cor/pulm: _____		Annet legemiddel ☐ ☐ _____		
Høyde: _____ Vekt: _____ Blodtrykk: _____		Puls: _____ (regelm./uregelm.)		
Signatur henviser: _____		Dato: _____		

Utfylles av anestesilege	Tidligere anestesi ☐ Nei ☐ Ja			
	Tidligere anestesikomplikasjon ☐ Nei ☐ Ja: _____			
	NYHA:	☐	Journal sett:	☐ ☐
	Resp.klasse:	☐	Blodprøver sett:	☐ ☐
	ASA:	☐	Pas. tilsett/informert:	☐ ☐
			Anmerkninger:	
	Medikament:	☐ Tiopental (Pentocur)	Nakkebevegelighet	☐ ☐
		☐ Propofol (Propolipid)	Tannstatus/gap	☐ ☐
		☐ Annet: _____	EKG	☐ ☐
			Rtg. Thorax	☐ ☐
		Rtg. Cervicalcolumna	☐ ☐	
Signatur anestesilege: _____		Dato: _____		

Premed.	Faste legemidler pasienten skal ta før ECT-behandling i henhold til prosedyre i ECT - Håndbok i EK: D44230	
	"ECT - premedisinering ved ECT behandling..."	
	Forordningskommentar i Metavision: «Kun før ECT» / «Også før ECT»	